

# ÓGLEÐI OG UPPKÖST Á MEÐGÖNGU / HYPEREMESIS GRAVIDARUM (HG)

**ICD-10 greiningar:**

**O21.0 Væg meðgönguuppköst**

**O21.1 Meðgönguuppköst með efnaskiptatruflunum**

Allt að 90% kvenna finna fyrir ógleði á meðgöngu og um helmingur þeirra kastar upp. Einkenni eru oftast frá 6.- 8. viku en í flestum tilfellum eru þau horfin fyrir 16. – 18. viku meðgöngu. Um 5% kvenna hafa einkenni alla meðgönguna.

Orsókin er óbekkt en ýmsar kenningar eru t.d. um tengsl við β-hCG, Helicobacter pylori o.fl. Ef ógleði byrjar fyrst eftir 12 vikna meðgöngu eru aðrar orsakir líklegrir, t.d. magabólga, þvagfærasýkingar, gallvegasjúkdómar, lyfjainntaka, sykursýki, meltingarvegasýkingar, ofstarfsemi skjaldkirtils, truflun í innra eyra o.fl.

Hyperemesis gravidarum (HG) er alvarlegasta ástandið og greinist hjá allt að 3% kvenna. Uppköst eru þá mikil og geta leitt til þyngdartaps, vökvaskorts, vannæringar og efnaskiptaröskunar. Þetta ástand krefst mats á sjúkrastofnun.

Alvarlegustu fylgikvillar hjá móður eru t.d. hyponatremia, hypokalemia, hypoglycemia, blóðsegar, Wernicke's encephalopathy, nýrnabilun, Mallory-Weiss rifur í vélinda ásamt þunglyndi. Alvarlegustu fylgikvillar hjá fóstri eru vaxtarskerðing og fyrirburrafæðing.

Ath. Konur sem hafa fyrri sögu um slæma meðgönguógleði gætu haft ávinning af því að hefja lyfjameðferð sem fyrst og jafnvel áður en einkenni koma fram.

## MAT Á EINKENNUM

Við mat á einkennum, alvarleika og meðferð er stuðst við PUQE skala. Sjá aftar í skjalinu. Ekki á lengur við að meta alvarleika meðgönguógleði og uppkasta með þvagstixi fyrir ketónum.

### PUQE skor ≤ 6. Væg einkenni.

Meðferð og eftirfylgd í heilsugæslu. Bjóða þétt eftirlit í mæðravernd og hafa lágan þróskuld fyrir lyfjameðferð. Nota PUQE skor við eftirfylgd.

Ráðleggingar við meðgönguógleði og uppköstum:

- Borða reglulega og lítið í einu. Narta í mat yfir daginn og gæta þess að verða ekki of svöng milli máltíða.
- Drekka vel t.d. vatn, vatn með ávoxtum og drykki sem innihalda sölt (t.d. Gatorade) ef um er að ræða mikla ógleði eða uppköst.
- Velja próteinríkan mat í litlum skömmum.
- Þurr, sætur, saltaður matur (t.d. ristað brauð, sæt kex, saltkex, saltstangir) þolist oft betur en annar.
- Kaldur matur og matur sem lyktar lítið þolist oft betur en annar.
- Forðast athafnir sem valda ógleði.
- Sleppa óþarfa vítamínum og bætiefnum.
- Hvíld frá daglegum störfum og álagi, íhuga veikindaleyfi.

EKKI hefur verið sýnt fram á árangur af notkun engifers, B6 vítamíns eða dáleiðslu í meðferð á ógleði og uppköstum. Árangur af notkun sjóveikiarmbanda eða nálastungu við ógleði og uppköstum hefur verið mismunandi eftir rannsóknum.

#### **PUQE skor 7-12. Miðlungs einkenni.**

Meðferð og eftirfylgd í heilsugæslu. Bjóða þétt eftirlit í mæðravernd. Þörf á lyfjameðferð ásamt styðjandi meðferð. Nota PUQE skor við eftirfylgd.

- Mælt er með að hefja meðferð með lyfi úr fyrsta vali, sjá töflu hér fyrir neðan.
- Ef áhrif eru ekki nægjanleg má bæta við lyfjum úr öðru vali þar sem samsett meðferð ber jafnan betri árangur en að skipta út lyfjum.
- Ef ekki næst árangur eða einkenni hafa varað í meira en 2 vikur þarf að meta þörf á iv. vökvagjöf.

#### **PUQE skor ≥ 13. Alvarleg einkenni.**

- Við alvarleg einkenni, klínísk merki um þurk eða þyngdartap meira en 5% ætti að vísa á sjúkrastofnun þar sem frekari meðferð er í boði.
- Ef uppköst og ógleði hindra inntöku nauðsynlegra lyfja er mikilvægt að hafa lágan þróskuld fyrir tilvísun á sjúkrastofnun.

#### **LYFJAMEÐFERÐ**

##### **Hafa í huga varðandi lyfjameðferð:**

- Ráðlagðar eru fastar gjafir á ógleðistillandi lyfjum frekar en að taka þau eftir þörfum.
- Hefja lyfjameðferð á H1 viðtakablokka og ekki skal nota nema einn þeirra í einu.
- Skili meðferð ekki árangri á 24-72 klst er lyfi úr öðru vali bætt við lyf úr fyrsta vali
- Ondansetron og Afipran má nota saman.

Lyfin eru flokkuð í fyrsta val og annað val og byggist flokkunin á aukaverkunum og því hve örugg lyfin eru talin á meðgöngu.

Afipran getur valdið aukaverkunum við langvarandi notkun (utanstrýtueinkenni) og því mælt með að takmarka meðferðarlengd við 5 daga í senn.

Ondansetrone hefur verið mikið notað undanfarin ár hjá barnshafandi konum. Einstaka rannsóknir hafa sýnt vægt aukna hættu á klofnum gómi/vör hjá fóstrum (11 vs 14 tilfelli pr 10.000 fæðingar) en óljóst er hvort sú áhætta tengist notkun á lyfinu. Varast skal Ondansetrone hjá konum með lengt QT bil.

LYF	LYFJA FLOKKUR
<b>Omeprazol® per os.</b> Ráðlagt til reynslu fyrir allar konur sem eru með meðgöngutengd uppköst og/eða ógleði. 20-40 mg x 1-2. Takist fyrst og fremst að kvöldi. Lausasölulyf.	Protonpumpuhemlar
<b>FYRSTA VAL</b>	
<b>Pyridoxin og doxylamín (Xonvea®) per os.</b> Inniheldur pyridoxin 10 mg og andhistamín doxylamín 10 mg. Byrjað er með 2 tbl. fyrir svefn og má auka í eina tbl. að morgni og eina tbl. um miðjan dag, skv. ráðleggingum á fylgiseðli. Hámarksskammtur er 4 tbl. á dag.  <b>Promethazine (Phenergan®) per os.</b> 25 mg x 1-3.  <b>Meclozinum (Postafen®) per os.</b> 25 mg x 1-2. Lausasölulyf.  <b>Chlorpromazine (Largactil ®) per os.</b> 25 mg ½ - 1 tbl á 4 - 6 klst fresti. Undanþágulyf í flokki geðlyfja. Gefið í lágum skömmum til að stilla ógleði. Má gefa samhliða H1 viðtakablokka.	Vítamín og H1 viðtakablokki  H1 viðtakablokki H1 viðtakablokki Geðlyf
<b>ANNAÐ VAL</b>	
<b>Metoclopramide (Afipran®) per os.</b> 10 mg x 3. Bætt við meðferð í fyrsta vali. Hámarksskammtur 30 mg á sólarhring. Hámark í 5 daga, taka nokkurra daga hlé og má þá hefja meðferð aftur.  <b>Ondansetrón (Zofran®) per os.</b> 4-8 mg x 2-3. Bætt við meðferð í fyrsta vali og með eða í stað Afipran. Hámarksskammtur er 32 mg á sólarhring. Mælt er með hægðamýkjandi meðferð samhliða, t.d. Magnesia Medic. Ath. Afipran og Ondansetrón má nota saman.	Dopamine antagonist  Seratónin antagonist

## PUQE-24 SKALI

Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) index

Á SÍÐASTA SÓLARHRING, HVE LANGAN TÍMA VARSTU MEÐ ÓGLEÐI EÐA MAGAVERK?				
alls engan (1)	< 1 klukkustund (2)	2-3 klukkustundir (3)	4-6 klukkustundir (4)	> 6 klukkustundir (5)
VARSTU MEÐ UPPKÖST Á SÍÐASTA SÓLARHRING?				
engin uppköst (1)	1-2 sinnum (2)	3-4 sinnum (3)	5-6 sinnum (4)	≥ 7 sinnum (5)
Á SÍÐASTA SÓLARHRING HVE OFT KÚGAÐIST PÚ ÁN UPPKASTA?				
aldrei (1)	1-2 sinnum (2)	3-4 sinnum (3)	5-6 sinnum (4)	≥ 7 sinnum (5)

**PUQE skor:**

**≤ 6 : Væg einkenni.**

**7-12: Miðlungs einkenni.**

**≥ 13: Alvarleg einkenni.**

Spurningalistinn er notaður til að meta alvarleika með gönguógleði og uppkasta og fylgjast með árangri meðferðar. Hátt skor gefur til kynna auknar líkur á næringarskorti og/eða vökvaskorti og þörf fyrir meðferð á sjúkrastofnun.