

Meðgöngusykursýki	Skjaldkirtilssjúkdómar	Fjölónæmar bakteríur	Fyrirburburafæðing
Einn eða fleiri áhættuþættir	Einn eða fleiri áhættuþættir	Áhættuþættir	Áhættuþættir
<b>Blóðrannsókn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aldur ≥ 35 ára: Skimun 24-28 vikur ef þetta er eini áhættuþátturinn</li> <li>Aldur ≥ 40 ára</li> <li>BMI ≥ 30</li> <li>Áður fætt þungbura: sama hver meðgöngulengdin var</li> <li>Áður GDM</li> <li>Saga um axlarklemmu í fyrrí fæðingu</li> <li>Skert sykurþol fyrir þungun: HbA1c 41-47mmól/mól</li> <li>Uppruni frá Asíu, Afríku, Mið-og Suður Ameríku, Mið-Austurlöndum</li> <li>Ættarsaga um sykursýki eða meðgöngusykursýki í fyrsta ættlið</li> </ul>	<b>Blóðrannsókn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BMI ≥ 40</li> <li>Grunur um joðskort t.d. vegna mataræðis</li> <li>Notkun ákveðinna lyfja t.d. Lithium og Amiodaron</li> <li>Saga um brotnám hluta skjaldkirtils eða geislun á háls</li> <li>Saga um fyrirburrafæðingu</li> <li>Saga um ófrjósemi</li> <li>Saga um ≥ 3 sjálfkrafa fósturlát í röð</li> <li>Skjaldkirtilssjúkdómur, saga um skjaldkirtilstruflun, saga um TPO mótefni eða stækkaður skjaldkirtill</li> <li>Sykursýki típa 1 eða aðrir sjálfsofnæmissjúkdómar</li> <li>Ættarsaga um skjaldkirtils-sjúkdóm í fyrsta ættlið</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dvöl á erlendri heilbrigðisstofnun &gt;24 klst á síðustu 6 mánuðum</li> <li>Flóttamaður</li> <li>Hælisleitandi</li> <li>Áður greinst með ónæmar bakteríur</li> <li>Hefur verið á syklalyfjum á sl. 6 mánuðum vegna kýlis eða húðsýkingar</li> <li>Ferðast á síðustu 6 mánuðum utan EES, Bandaríkjanna og Kanada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fyrri saga um fósturmissi eða fyrirburrafæðingu við 16-34 v</li> <li>Lífræðileg frávik í legi</li> <li>Fyrri saga um keisara-skurð á fulla útvíkkun</li> <li>Fyrri saga um óvenju stóran keiluskurð, stutt frá keiluskurði eða fleiri en einn keiluskurð</li> </ol> <p><b>Ef 1 og/eða 2 á við:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilvísun til sérfræðings í áhættumeðgönguvernd</li> </ul> <p><b>Ef 3 og/eða 4 á við:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leghálmæling samhlíða 20 vikna ómskoðun</li> </ul> <p><b>Sjá vinnuleiðbeiningar:</b> Áhætta á fyrirburrafæðingu</p> <p><b>Klamydia</b></p> <p><b>Áhættuþættir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aldur ≤25 ára</li> </ul>
Skimun fyrir 16 viku: HbA1c mæling. Skimun 24-28 vikur: Sykurþolspróf	Mæla TSH	Sýnataka, strok: Ef 1. 2. eða 3. á við: MÓSA, BBL og VÓE. Ef 4. eða 5. á við: MÓSA Ef 6. á við: BBL	Í upphafi meðgöngu: Strok frá leggögum eða leghálsi. Þvag?
<b>Sjá vinnuleiðbeiningar:</b> Meðgöngusykursýki-skimun-greining-meðferð	<b>Sjá vinnuleiðbeiningar:</b> Skjaldkirtilssjúkdómar á meðgöngu	<b>Sjá vinnuleiðbeiningar:</b> Skimun fyrir fjölónæmum bakteríum	<b>Sjá fróðleiksmola:</b> Klamýdia á meðgöngu