

<u>Meðgöngusykursýki</u>	<u>Skjaldkirtilssjúkdómar</u>	<u>Fjölónæmar bakteríur</u>	<u>Fyrirburburafæðing</u>
<u>Einn eða fleiri áhættuþættir</u>	<u>Einn eða fleiri áhættuþættir</u>	<u>Áhættuþættir</u>	<u>Áhættuþættir</u>
Blóðrannsókn: <ul style="list-style-type: none"> Aldur \geq 35 ára: Skimun 24-28 vikur ef þetta er eini áhættuþátturinn Aldur \geq 40 ára BMI \geq 30 Áður fætt þungbura: sama hver meðgöngulengdin var Áður GDM Saga um axlarklemmu í fyrrí fæðingu Skert sykurþol fyrir þungun: HbA1c 41-47mmól/mól Uppruni frá Asíu, Afríku, Mið-og Suður Ameríku, Mið-Austurlöndum Ættarsaga um sykursýki eða meðgöngusykursýki í fyrsta ætti 	Blóðrannsókn: <ul style="list-style-type: none"> BMI \geq 40 Grunur um joðskort t.d. vegna matarædis Notkun ákveðinna lyfja t.d. Lithium og Amiodaron Saga um brotnám hluta skjaldkirtils eða geislun á háls Saga um fyrirburrafæðingu Saga um ófrjósemi Saga um \geq 3 sjálfkrafa fósturlát í röð Skjaldkirtilssjúkdómur, saga um skjaldkirtilstreuflun, saga um TPO mótefni eða stækkaður skjaldkirtill Sykursýki típa 1 eða aðrir sjálfsöfnæmissjúkdómar Ættarsaga um skjaldkirtils-sjúkdóm í fyrsta ætti 	<ol style="list-style-type: none"> Dvöl á erlendri heilbrigðisstofnun $>$ 24 klst á síðustu 6 mánuðum Flóttamaður Hælisleitandi Áður greinst með ónæmar bakteríur Hefur verið á syklalyfjum á sl. 6 mánuðum vegna kýlis eða húðsýkingar Ferðast á síðustu 6 mánuðum utan EES, Bandaríkjanna og Kanada 	<ul style="list-style-type: none"> Fyrri saga um fósturmissi eða fyrirburrafæðingu við 16-34 v Líffræðileg frávik í legi Fyrri saga um keisara-skurð á fulla útvíkkun Fyrri saga um óvenju stóran keiluskurð, stutt frá keiluskurði eða fleiri en einn keiluskurð <p>Ef 1. og/eða 2. á við:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilvísun til sérfræðilæknis í áhættumeðgönguvernd <p>Ef 3. og/eða 4. á við:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leghálmæling samhlíða 20 vikna ómskoðun <p>Sjá vinnuleiðbeiningar: Áhætta á fyrirburrafæðingu</p> <p>Klamydia</p> <p>Áhættuþættir</p> <ul style="list-style-type: none"> Aldur \leq 25 ára
Skimun fyrir 16 viku: HbA1c mæling. Skimun 24-28 vikur: Sykurþolspróf	Mæla TSH	Sýnataka, strok: Ef 1. 2. eða 3. á við: MÓSA, BBL og VÓE. Ef 4. eða 5. á við: MÓSA Ef 6. á við: BBL	Í upphafi meðgöngu: Strok frá leggögum eða leghálsi. Þvag?
Sjá vinnuleiðbeiningar: Meðgöngusykursýki-skimun-greining-meðferð	Sjá vinnuleiðbeiningar: Skjaldkirtilssjúkdómar á meðgöngu	Sjá vinnuleiðbeiningar: Skimun fyrir fjölónæmum bakteríum	Sjá vinnuleiðbeiningar: Klamýdia á meðgöngu