

<u>Meðgöngusykursýki</u>	<u>Skjaldkirtilssjúkdómar</u>	<u>Fjölónæmar bakteríur</u>	<u>Klamydia</u>
Einn eða fleiri áhættuþættir	Einn eða fleiri áhættuþættir	Áhættuþættir	Áhættuþættir
<p>Blóðrannsókn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aldur ≥ 35 ára: Skimun 24-28 vikur ef þetta er eini áhættuþátturinn Aldur ≥ 40 ára BMI ≥ 30 Áður meðgöngusykursýki Áður fætt þungbura: sama hver meðgöngulengdin var Saga um axlarklemmu í fyrri fæðingu Skert sykurþol fyrir þungun: HbA1c 41-47mmól/mól Uppruni frá Asíu, Afríku, Mið-og Suður Ameríku, Mið -Austurlöndum Ættarsaga um sykursýki eða meðgöngusykursýki í fyrsta ættlið 	<p>Blóðrannsókn:</p> <ul style="list-style-type: none"> BMI ≥ 40 Grunur um joðskort t.d. vegna mataræðis Notkun ákveðinna lyfja t.d. Lithium og Amiodaron Saga um brottnám hluta skjaldkirtils eða geislun á háls Saga um fyrirbura-fæðingu Saga um ófrjósemi Saga um ≥ 3 sjálfkrafa fósturlát í röð Skjaldkirtilssjúkdómur, saga um skjaldkirtils-truflun, saga um TPO mótefni eða stækkaður skjaldkirtill Sykursýki típa 1 eða aðrir sjálfsofnæmis-sjúkdómar Ættarsaga um skjaldkirtilssjúkdóm í fyrsta ættlið 	<ol style="list-style-type: none"> Dvöl á erlendri heilbrigðisstofnun >24 klst á síðustu 6 mánuðum Flóttamaður Hælisleitandi Áður greinst með ónæmar bakteríur Hefur verið á syklalyfjum á sl. 6 mánuðum vegna kýlis eða húðsýkingar Ferðast á síðustu 6 mánuðum utan EES, Bandaríkjana og Kanada <p>ATH.! Ef kona hefur áður greinst með BBL og/eða VÓE er viðkomandi alltaf beri og ekki þörf á skimun</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aldur ≤ 25 ára
<p>Skimun fyrir 16 viku: HbA1c mæling Ef áður meðgöngusykursýki mæla fastandi blóðsykur ásamt HbA1c mælingu</p> <p>Skimun 24-28 vikur: Sykurþolspróf</p> <p><u>Sjá fróðleiksmola:</u> Meðgöngusykursýki-skimun-greining-meðferð</p>	<p>Í upphafi meðgöngu: Mæla TSH</p> <p><u>Sjá fróðleiksmola:</u> Skjaldkirtilssjúkdómar á meðgöngu</p>	<p>Sýnataka, strok: Ef 1. 2. eða 3. á við: MÓSA, BBL og VÓE.</p> <p>Ef 4. eða 5. á við: MÓSA</p> <p>Ef 6. á við: BBL</p> <p><u>Sjá fróðleiksmola:</u> Skimun fyrir fjölónæmum bakteríum</p>	<p>Í upphafi meðgöngu: Strok frá leggöngum eða leghálsi.</p> <p><u>Sjá fróðleiksmola:</u> Klamydía á meðgöngu</p>